

殺虫殺菌剤

第 23228 号

サンヨール®・トレボン®スプレー

種類名：エトフェンプロックス・DBEDC水和剤

特長

- 本製品は、長年、農家にご愛用いただいているサンヨール乳剤と、花・野菜用殺虫剤のトレボン乳剤をご家庭でも使いやすい様に希釈したそのまま使えるスプレー剤です。
- ばら・きくのアブラムシ類・うどんこ病、お花のうどんこ病に、きゅうり・トマトの虫・病気にも効果があります。

【有効成分】 エトフェンプロックス0.020%
DBEDC0.040%

【性状】 淡青紫色水和性懸濁液体 【毒性】 普通物* 【危険物】 -

【有効年限・包装】 3年・1000mL×16

*普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

サンヨールは米澤化学(株)の登録商標です。トレボンは三井化学アグロ(株)の登録商標です。

商品規格



〈通常ラベル〉				〈庭木用ラベル〉			
規	格	入	数	規	格	入	数
1000ml		16		1000ml		16	
希望小売価格・税抜(税込価格)				希望小売価格・税抜(税込価格)			
1,300円(1,404円)				1,300円(1,404円)			
サイズ幅×高さ×奥行(mm) 重量				サイズ幅×高さ×奥行(mm) 重量			
個装	110×250×90		1.1kg	個装	110×250×90		1.1kg
中箱				中箱			
外箱	510×290×390		19.5kg	外箱	510×290×390		19.5kg
ITFコード				ITFコード			
14571367110167				14571367110310			
JANコード				JANコード			
4571367110160				4571367110313			

適用病害虫・使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックス	DBEDC
きゅうり	うどんこ病 べと病 アブラムシ類 コナジラミ類	原液	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内
トマト	灰色かび病 葉かび病 アブラムシ類 コナジラミ類			2回以内		2回以内	
きく	うどんこ病 白さび病 アブラムシ類 ハダニ類		発生初期	6回以内		6回以内	8回以内
ばら	うどんこ病 黒星病 アブラムシ類 チュウレンジハバチ ハダニ類						
花き類・観葉植物 (ばら、きくを除く)	うどんこ病 アブラムシ類 ハダニ類 ナメクジ類						
樹木類	うどんこ病 アブラムシ類 ケムシ類						

■については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

使用上の注意

- (1)使用に際しては容器をよく振ること。
- (2)ハウス又は露地栽培で高温時の場合には葉の変色等の薬害を生ずるおそれがあるので、その場合は使用をさけること。
- (3)多湿下の施設内で使用する場合は、散布した薬液が速く乾燥するように通気性をよくして散布すること。
- (4)ミツバチ及びびりに対して影響があるので、注意して使用すること。
- (5)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6)本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- (1)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2)散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (3)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (4)人に向かって噴射しないこと。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

引火性があるので、火気に十分注意すること。

貯蔵上の注意事項

- (1)火気を避け、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管すること。
- (2)子供の手の届かない場所に保管すること。