


水稲のウンカ・ヨコバイ類を始め、ドロオイ、カメムシ、イナゴなど主要害虫に速効的で強力な効果。さらにだいた、えだまめ、あすき、とうもろこし、かんしょ、キャベツ、小麦、やまのいも、きゅうり、はくさい、だいこん、さといも、れんこんに登録があります。



すぐ効く、よく効く、ながく効く

きゅうり、
はくさい、だいこん、
キャベツ、
さといもにも
使えます。

農業用殺虫剤



トレボン®粉剤DL

有効成分：エトフェンブロックス……0.50%

トレボンは三井化学アグロ株式会社の登録商標です。



ツマグロヨコバイ



トビイロウンカ



セジロウンカ



ヒメトビウンカ



イネドロオイムシ



イネミズノムシ



イナゴ類



カメムシ類



ウリハムシ



アオムシ

トレボン® 粉剤DL

人畜毒性：普通物*

*「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

■適用害虫および使用方法

(平成26年7月23日付拡大登録内容を含む)

| 作物名 | 適用場所 | 適用害虫名 | 使用量 (kg/10a) | 使用時期 | 本剤およびエトフェンブロックスを含む農薬の総使用回数 | 使用方法 |
|----------------------|------|--|--------------|--------------|----------------------------|------|
| 稲 | — | イネツトムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ アザミウマ類 イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ | 4 3~4 | 収穫7日 前まで | 3回以内 | 散布 |
| | | イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ | 3 | | | |
| 水田作物 畑作物 (休耕地) | ※ | カメムシ類 | 3~4 | — | | |
| 小麦 | — | ヒメトビウンカ アブラムシ類 | 4 | 収穫14日 前まで | 2回以内 | |
| きゅうり | — | ウリハムシ | 3~4 | 収穫前日 まで | 3回以内 | |
| はくさい | | アオムシ | | 収穫7日 前まで | | |
| だいこん | | | | 収穫21日 前まで | | |
| 豆类 (種実) | — | ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 アズキノメイガ | 4 | 収穫14日 前まで | 2回以内 | |
| | | えだまめ | 3~4 | | | |
| れんこん | — | マメコガネ | 4 | 収穫7日 前まで | 3回以内 | |
| やまのいも | | シロイチモジヨトウ | | | | |
| さといも | | ハスモンヨトウ | | | | |
| かんしょ | | ナカジロシタバ | | | | |
| とうもろこし | | アワノメイガ | | | | |
| キャベツ | — | ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ | 3~4 | 収穫3日 前まで | 3回以内 | |

※ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕地

特長

- ① 水稲のウンカ・ヨコバイ類に優れた効果
- ② 優れた速効性と残効性
- ③ 抵抗性害虫にも有効
- ④ 幅広い作物の害虫にも有効

⚠ 使用上の注意事項

- ① 水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用は避けてください。
- ② 散布後は水管理に注意してください。
- ③ 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ④ 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布してください。
- ⑤ イネミズゾウムシ成虫に使用する場合、移動範囲が広いのでなるべく広域でいっせいに防除し、畦畔などの周辺雑草にも散布してください。
- ⑥ 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬書の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- ⑦ 誤食などのないよう注意してください。
- ⑧ 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- ⑨ 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- ⑩ 作業後は手足、顔等を石けんをよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- ⑪ 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- ⑫ 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
- ⑬ ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散する恐れがある場合には使用しないでください。
 - 養蜂が行われている地区や受粉等を目的としてミツバチ等を放飼している地区で使用する場合は、関係機関(都道府県の畜産部局や病害虫防除所等)への連絡を徹底し、ミツバチ等の危害防止に努めてください。

万一、誤食・誤飲した場合には、速やかに医師の手当を受けてください。皮膚などにかかった場合には、十分な水で洗い流してください。さらに、異常を感じた場合は、医師の手当を受けてください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ○防除日誌を記帳しましょう。

*本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

*本印刷物は平成27年4月15日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

TRD1D01G



三井化学アグロ株式会社
東京都中央区日本橋1-19-1日本橋ダイヤビルディング
ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>