

特長

- 本剤は、極めて少ない注入量で処理時の注入性を向上することにより、注入作業を時間短縮、大掛かりな散布器具や注入容器も不要です。
- 極めて少ない注入量で、樹体への影響を最小限にとどめます。これまで評価した樹木で、薬害が観察された事例はありません。
- 薬液の飛散・環境流出がない樹幹注入剤です。
- 本剤は、処理適期の1回処理で対象害虫の当年発生を抑えます。
- 本剤を各種害虫発生前～発生初期に樹幹注入することにより、速やかに有効成分ジノテフランが葉部へ行き渡り、公園、街路樹等の食葉性吸汁性の主要害虫を中心に優れた殺虫効果が得られます。

【有効成分】 ジノテフラン 8.0%

【性状】 淡黄色澄明水溶性液体 【毒性】 普通物* 【危険物】 -

【有効年限・包装】 3年・450ml×2

*普通物：「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

ウッドスターはサンケイ化学(株)の登録商標です。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフラン
さくら	ケムシ類	胸高直径 6cm~10cm: 8~12mL 10cm~20cm:12~24mL 20cm~30cm:24~36mL 30cm~40cm:36~48mL 40cm~50cm:48~60mL 50cm~60cm:60~72mL 以降、直径が10cm増す毎に12mLを追加する	幼虫発生前 ~発生初期 但し 新葉展開後			
つばき類	チャドクガ	注入部直径 6cm~10cm:2mL 10cm~20cm:2~12mL 20cm~30cm:12~18mL 30cm~40cm:18~24mL 40cm~50cm:24~30mL 50cm~60cm:30~36mL 以降、直径が10cm増す毎に6mLを追加する	幼虫発生前 ~発生初期	3回以内	樹幹注入	5回以内
プラタナス	プラタナス グンバイ	胸高直径 6cm~10cm:2mL 10cm~20cm:2~12mL 20cm~30cm:12~18mL 30cm~40cm:18~24mL 40cm~50cm:24~30mL 50cm~60cm:30~36mL 以降、直径が10cm増す毎に6mLを追加する	新葉展開後			

使用上の注意

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。

- 他剤との混用はさけること。
- 樹幹の胸高直径または注入部直径が適用表に記載のない小径木や樹勢の弱った木、空洞や腐朽がある木、極端な老齢木には使用をさけること。
- 薬剤注入孔は、ドリル等を用いて注入部位に斜め下方向に45度の角度で開けること。
- 対象木が二股以上に分かれている場合は薬剤が問題なく分散する様にそれぞれを1本の木と見なして所定量を注入すること。
- さくらに使用する場合は以下の内容を注意すること。
 - 薬剤の注入部位は主幹部の地上高50~100cm程度を標準とすること。
 - 直径5~10mm、深さ6~7cmの注入孔を開け、専用注入器を用いて1孔当たり4mLを注入する。但し、注入孔直径10mm未満で使用する場合は、必ず専用の注入補助器を注入孔に挿入し使用すること。
 - 小径木に使用する場合は、専用の注入補助器を挿入し使用、若しくは所定量を2孔以上に分散させること。
 - 落花直後や展葉初期には薬剤が分散しにくいので、落花終了後の新葉が十分に展開した後に注入すること。
 - アメリカシロヒトリ、モンクロシャチホコの幼虫発生前に注入することが望ましい。
 - 花、葉、果実は食用に供しないこと
- やぶつばきに使用する場合は、以下の内容に注意すること。
 - 薬剤の注入部位は主幹部の地上高10~30cm程度を標準とすること。
 - 直径5~7mm、深さ6~7cmの注入孔を開け、専用注入器を用いて1孔当たり2mLを注入する。但し、注入孔直径7mm未満で使用する場合は、必ず専用の注入補助器を注入孔に挿入し使用すること。
 - 小径木に使用する場合は、専用の注入補助器を挿入し使用、若しくは所定量を2孔以上に分散させること。
 - チャドクガの幼虫発生前に注入することが望ましい。
 - 種子は食用に供しないこと。
- プラタナスに使用する場合は、以下の内容に注意すること。
 - 薬剤の注入部位は主幹部の地上高50~100cm程度を標準とすること。
 - 直径5~7mm、深さ6~7cmの注入孔を開け、専用注入器を用いて1孔当たり2mLを注入する。但し、注入孔直径7mm未満で使用する場合は、必ず専用の注入補助器を注入孔に挿入し使用すること。
 - 小径木に使用する場合は、専用の注入補助器を挿入し使用、若しくは所定量を2孔以上に分散させること。
 - 落葉期や整枝剪定後の展葉初期には薬液が分散しにくいので、新葉展開後に注入すること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - 開花期はミツバチ等に影響を及ぼすおそれがあるので、落花終了後に使用すること。
 - 養蜂が行われている地区や受粉等を目的としてミツバチ等を放飼している地区で使用する場合は、関係機関(都道府県の畜産部局や病害虫防除所等)への連絡を徹底し、ミツバチ等の危害防止に努めること。
- 本剤は自動車、壁等の塗装面、大理石や御影石等に薬剤が付着すると変色するおそれがあるので、こぼさないように注意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は林業関係機関、林業技術者等の指導を受けること。

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用法ではその該当がない。

貯蔵上の注意事項

直射日光を避け、食品と区別して、なるべく冷涼で子供の手が届かない場所に密栓して保管すること。