

殺虫剤／樹幹注入剤

農林水産省登録
第23624号

ウッドスター[®]

有効成分：ジノテフラン 8.0%

さくらのクビアカツヤカミキリに
適用拡大!

少量注入で
クビアカツヤカミキリ幼虫に
安定した駆除効果を示す



クビアカツヤカミキリ(成虫)



排出されたフラス

適用拡大の内容 (2019年5月15日登録)

ウッドスター[®]はサンケイ化学株の登録商標です。

| 作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 |
|-----|------------|---|-----------------|----------|----------|-------------------|
| さくら | クビアカツヤカミキリ | 注入部直径 6cm~10cm:8~12ml 10cm~20cm:12~24ml 20cm~30cm:24~36ml 30cm~40cm:36~48ml 40cm~50cm:48~60ml 50cm~60cm:60~72ml 以降、直径が10cm増す毎に12mlを追加する | 新葉展開後 ~落葉前まで | 3回 以内 | 樹幹 注入 | 5回以内 |

*ウッドスターの全登録内容については、FAMIC (農林水産消費安全技術センター) の農薬登録情報提供システムのウェブサイトを参照ください。

性状：淡黄色澄明水溶性液体 人畜毒性：普通物(毒物にも劇物にも該当しないものを指している通称) 規格：450ml×2本


ウッドスターの使い方

クビアカツヤカミキリ防除用

クビアカツヤカミキリの生態と防除適期(参考)



ウッドスターの使用方法



クビアカツヤカミキリを対象に使用する際の注意事項

- 薬剤の注入部位は**地際部**を標準とすること。
- 被害木(フラスが排出されている樹)は薬剤が分散しにくい場合があるので、クビアカツヤカミキリの食入孔をさけて注入すること。
- 樹体内中の幼虫の完全駆除には、複数年の連続処理が効果的である。
- 他剤との混用は避けること。
- 注入部直径が適用表に記載のない小径木や樹勢の弱った木、空洞や腐朽がある木、極端な老齢木には使用を避けること。
- 対象木が二股以上に分かれている場合は薬剤が問題なく分散するようにそれぞれ1本の木とみなして所定量を注入すること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - 開花期はミツバチなどに影響を及ぼすおそれがあるので、落花終了後に使用すること。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関への農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 本剤は自動車、壁等の塗装面、大理石や御影石等に薬剤が付着すると変色するおそれがあるので、こぼさないように注意すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は林業関係機関、林業技術者等の指導を受けること。
- 新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお林業関係機関、林業技術者等の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく冷涼で子供の手が届かない場所に密栓して保管してください。

※その他、製品ラベルに記載されている注意事項を守って使用してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届かぬ所に置かないでください。

本印刷物は2019年5月15日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

MCRWS(クビアカ)-2019.5

【販売】

株式会社 **エムシー緑化** 
 東京都中央区日本橋本町1-9-1 S-GATE日本橋本町
 ☎(03) 5290-2956

【製造・販売】

 **サンケイ化学株式会社**
 本社 鹿児島市南栄二丁目9番地 ☎(099) 268-7588
 東京営業部 埼玉県深谷市幡羅町1-13-1 ☎(048) 551-2122