

除草剤



クサグリア®

ヨモギ・スギナ・ススキ・チガヤ・タンポポ・アシ・ササ・クズ などに

葉にかけて根まで枯らす



特長

- 土に落ちると不活性化、散布直後でも作物・草花の種まき、植え付けができます。
- 長期間、雑草の発生をおさえます。
- 成分はアミノ酸系で、土壌微生物により自然物に分解されます。

**農耕地
登録品**



規格	入数	希望小売価格・税込(税抜)
500ml	20	1,050円(本体価格1,000円)
サイズ幅×高さ×奥行(mm)		重量
個装	70×192×70	660g
外箱	365×225×305	17.5kg
JANコード		



4 571367 110085

規格	入数	希望小売価格・税込(税抜)
1L	12	2,058円(本体価格1,960円)
サイズ幅×高さ×奥行(mm)		重量
個装	88×224×88	1.3kg
外箱	375×255×305	17.4kg
JANコード		



4 571367 110092

規格	入数	希望小売価格・税込(税抜)
5L	4	10,080円(本体価格9,600円)
サイズ幅×高さ×奥行(mm)		重量
個装	180×286×130	6.4kg
外箱	390×320×300	26.8kg
JANコード		



4 571367 110108

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。

適用雑草と使用方法

*印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		総使用回数*		使用方法			
				薬量(mL)	希釈水量(L)	本剤	グリホサート剤				
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500	通常散布100 少量散布25	3回	3回	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布			
		多年生雑草	生育盛期	2000	少量散布25~50						
林木	造林地(地ごしらえ)	ススキ、ササ類、クズ等の多年生雑草、落葉雑草	生育盛期以降	1000	20~30	3回	3回	雑草木茎散布			
樹木類(※野菜類を除く)	—	一年生雑草	雑草生育期	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50	4回	4回	雑草茎葉散布			
とうがらし類、にんじん、ピーマン		耕起又は定植7日前まで(雑草生育期)	1回			1回					
アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、しゃくやく(薬用)、たまねぎ、たらぎ、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス			耕起又は定植7日前まで(雑草生育期)			3回	3回				
薬用にんじん、キャベツ、だいごん、はつかだいごん		耕起又は定植7日前まで(雑草生育期)				10回(1年間に2回)	1回				
ねぎ			耕起又は定植7日前まで(雑草生育期)			2回	2回				
		定植後畦間処理、収穫30日前まで(雑草生育期)				3回	3回				
果樹類(かんきつ、パイナップルを除く)		一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期)			500~1000	500~1000		5回	5回	
多年生雑草			草丈30cm以下			250~500	250~500				
かんきつ		多年生雑草	草丈30cm以下			500~1000	500~1000		5回	5回	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		総使用回数*		使用方法
				薬量(mL)	希釈水量(L)	本剤	グリホサート剤	
だいず	圃場内の周縁部	一年生雑草	は種7日前まで(雑草生育期) は種後出芽前まで(雑草生育期) 草丈30cm以下	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50	2回	4回	雑草散布
えだまめ		一年生雑草	は種後出芽前まで(雑草生育期)	250~500	25~100	2回	2回	
小麦	圃場内の周縁部	多年生イネ科雑草	耕起前又はは種前まで(雑草生育期) 草丈30cm以下	250~1000	25~100	3回	3回	
		一年生雑草	は種後出芽前(雑草生育期)	250~500	100	1回		
		多年生雑草	耕起7日前まで(雑草生育期) 草丈30cm以下	500~1000	100	1回		
麦類(小麦を除く)	圃場内の周縁部	一年生雑草	は種後出芽前(雑草生育期)	250	25~100	3回	3回	
かんしょ		一年生雑草	耕起又は播種7日前まで(雑草生育期)	250~500	100	1回		
茶	圃場内の周縁部	一年生雑草	摘採7日前まで(雑草生育期)	250~500	少量散布25~50	1回	2回	
水田作物(水稲を除く)		水田刈跡	耕起20~10日前(雑草生育期)	100	100	1回		
水田作物(水稲を除く)	水田刈跡	多年生雑草	雑草生育期	500~1000	25~100	1回	1回	
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで(雑草生育期)	250~500	通常散布100 少量散布25	2回	3回	
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	多年生雑草	草丈30cm以下	500~1000	少量散布25	2回		
水田作物、畑作物(休耕田)	休耕田	一年生雑草	雑草生育期(草丈50cm以下)	250~500	通常散布50~100 少量散布25~50	2回	3回	

使い方

本剤を水でうすめ、噴霧器または目の細かいジョウロで、雑草の茎葉にむらなく散布して下さい。

※野菜類と記載されている作物は以下を除く。

とうがらし類、にんじん、ピーマン、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、しゃくやく(薬用)、たまねぎ、たらぎ、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用にんじん、キャベツ、だいごん、はつかだいごん、ねぎ、えだまめ

注入処理・塗布処理

下記適用以外には使用しないで下さい。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	総使用回数*		使用方法	
						本剤	グリホサート剤		
林木	林地	クズ	春期又は秋期	原液又は2倍液	1~2mL/株 1mL/ヶ所	—	—	株頭注入処理	
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	落葉雑草かん木	5~10月	原液又は2倍液	樹径 10cm以下 10~20cm 20cm以上	ヶ所数 2~3 4~8 10	—	—	立木注入処理
		雑草かん木	伐採直後	原液	切り口全体に十分量を塗布	5~15mL/本	—	—	植栽地を除く樹木等の周辺地に切株塗布処理 竹稈注入処理
林木、畑作物	林地、放置竹林、畑地	竹類	夏~秋期	原液	5~15mL/本	—	—	竹稈注入処理	

【希釈倍数(目安)】

- 一年生雑草：100~200倍
- 多年生雑草：100倍
- ススキ・ササ・クズ：25倍

【希釈の目安】本剤を水でうすめ、噴霧器または目の細かいジョウロで、雑草の茎葉にむらなく散布して下さい。

水量	クサクリアの薬量(mL)			
	200倍	100倍	50倍	25倍
1L	5mL	10mL	20mL	40mL
5L	25mL	50mL	100mL	200mL

△ 効果・薬害等の注意

●本剤はグリホサートを含む農薬であるので、他のグリホサートを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用して下さい。●薬液の調製には濁った水は用いないで下さい(効果)●最着剤の加用は必要ありません。●土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理(効果)●散布前に雑草の地上部を刈り払わないで下さい(効果)●本剤は通常2~14日で効果が発現するので、誤って再散布しないで下さい。●土壌が流出したり、くずれたりするおそれのある所では使用しないで下さい。●スギナには生育期を過ぎた時期での散布及び他雑草の中に埋没しているような条件下では効果が劣ることがあるので、適期にスギナにかかると散布して下さい。●処理後6時間以内の降雨は効果を低下させることがあります。●少量散布の場合は、少量散布用ノズルを用いて下さい。●水田への飛散、流入等により水稲に薬害を生じるので、十分注意して下さい。●出芽前に使用する場合は、作物の出芽後に散布すると薬害を生じるおそれがあるので、必ず出芽前に散布して下さい。●注入処理における注意●クズには株頭にナタなどで傷をつけ、薬液がよくしみ込むように注入処理して下さい。●落葉雑草かん木には、樹幹の回りに等間隔にナタ目を入れ、薬液を注入処理して下さい。●処理竹から15m以内に発生したたけのこを食用に供さないで下さい。また、縄目いり立て札によりたけのこが採取されないようにして下さい。●雑草かん木に塗布処理を行う場合は、伐採後、直ちに切り口全面に直接塗布して下さい。●特に生育期畦間散布に使用する場合には作物にかからないよう十分注意して散布して下さい。●農作物や有用植物に薬液が付着すると、激しい薬害が生じるので、かからないよう十分注意して下さい。●調製及び保管には合成樹脂の塗布のない鋼製鉄(ステンレスを除く)の容器類は使用しないで下さい。容器及び散布器具は、使用后十分に水洗いして下さい。●使用量、使用時期、使用方法を守って下さい。適用作物群に属する作物又はその新品種に対しては、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

△ 安全使用上の注意

●眼に入らないように注意して下さい。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の担当を受けて下さい(刺激性)●使用の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用して下さい。●作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして、洗眼して下さい。●公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄目いり立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払って下さい。●公園、堤とう等で使用する場合は、特に以下のことに注意して下さい。①水源池、養殖池等に飛散、流入しないよう十分に注意して下さい。②散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理して下さい。●使用済りの薬液は必ず安全な場所に保管して下さい。

魚毒性等… 養殖池等周辺での使用はさける(魚類)。養魚田周辺での使用には特に注意。散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意。

保管… 密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷凍所に保管して下さい。

【有効成分】グリホサートイソプロピルアミン塩…41.0%
 【性状】淡黄色澄明水溶性液体
 【毒性】普通物※
 【有効年限・包装】5年・500mL×20、1L×12、5L×4

※[毒物および劇物取締法](厚生労働省)に基づく特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。
 ※本製品は茎葉処理除草剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
 ※本印刷物は2020年12月10日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成されていますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

販売元



株式会社 エムシー緑化

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-1
 TEL 03-5290-2956 FAX 03-5290-2957
 ホームページ <https://www.mc-ryokka.com>

取扱い