

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルスルフアミド
キャベツ	菌核病	30kg/10a (30g/m <sup>2</sup> )	定植前	2回以内	全面土壌混和	2回以内
	根こぶ病	20~30kg/10a (20~30g/m <sup>2</sup> )	は種又は定植前		作条土壌混和	
		20kg/10a (20g/m <sup>2</sup> )			作条土壌混和	
はくさい ブロッコリー カリフラワー 非結球あぶらな科 葉菜類(なばな類 を除く)	根こぶ病	20~30kg/10a (20~30g/m <sup>2</sup> )	は種又は定植前	全面土壌混和	1回	
なばな類		20kg/10a (20g/m <sup>2</sup> )		は種前		作条土壌混和
		20~30kg/10a (20~30g/m <sup>2</sup> )	定植前			全面土壌混和
レタス	菌核病	20~30kg/10a (20~30g/m <sup>2</sup> )		定植前		1回
かぶ	根こぶ病	30kg/10a (30g/m <sup>2</sup> )	は種又は定植前	全面土壌混和		
		20kg/10a (20g/m <sup>2</sup> )		作条土壌混和		
だいこん		30kg/10a (30g/m <sup>2</sup> )	は種前	全面土壌混和		
ばれいしょ	そうか病	30kg/10a (30g/m <sup>2</sup> )	植付時	作条土壌混和	2回以内 (種いも 浸漬は 1回以内、 土壌混和は 1回以内)	
	そうか病 粉状そうか病	60kg/10a (60g/m <sup>2</sup> )		全面土壌混和		

■ については有効成分を含む農薬の総使用回数を示すものです。