

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフラン	
きゅうり	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、 定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回 以内)	
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布		
1g/株		植穴土壌混和			3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 散布は2回以内)		
メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類		2g/株				定植時
アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	1~2g/株					
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	生育期 但し、収穫 21日前まで		株元散布	4回以内(育苗期の 株元散布及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、定植後の株元 散布は1回以内、散布 は2回以内)	
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類		定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和 及び育苗トレイへの 灌注は合計1回以内、 散布は2回以内)	
なす	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類	1~2g/株	生育期 但し、収穫 前日まで				2回以内
	アブラムシ類	1g/株					
トマト ミニトマト	ハモグリバエ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時		1回	植穴土壌混和	5回以内 (培土混和及び灌注は 合計1回以内、育苗期 の株元散布は1回以内、 定植時の土壌混和は 1回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫 前日まで	2回以内	株元散布		
ピーマン	アザミウマ類		1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、 散布及び定植後の 株元散布は合計2回 以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫 前日まで	2回以内	株元散布		
とうがらし類	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、 定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回 以内)	
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布		
キャベツ		アオムシ コナガ	2~3g/株		定植時	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布及び無人 航空機散布は合計2 回以内)
	ハイマダラノメイガ	3g/株					
はくさい	アブラムシ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布は2回以内)	
	アオムシ コナガ	2~3g/株					
ブロッコリー	アオムシ コナガ	2g/株	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布及び無人 航空機散布は合計2 回以内)	
	ハイマダラノメイガ	3g/株					
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6g/m ²	生育期 但し、収穫 3日前まで		2回以内	株元散布	4回以内(は種時の 土壌混和、育苗トレイ への灌注及び定植時 の株元散布は合計1回 以内、生育期の株元 灌注は1回以内、散 布、無人航空機散布 及び定植後の株元 散布は合計2回以内)
	ハモグリバエ類	9g/m ²	は種時		1回	播溝土壌混和	4回以内(は種時の 土壌混和は1回以内、 生育期の株元灌注は1 回以内、散布は2回 以内)
だいこん	アブラムシ類	6g/m ²	生育期 但し、収穫 30日前まで	全面土壌混和		5回以内(は種時の 播溝土壌混和は1回 以内、は種時の全面 土壌混和は1回以内、 粒剤の散布は1回以 内、水溶剤の散布、 液剤の散布及び無人 航空機散布は合計2 回以内)	
	キスジノミハムシ	4~6g/m ² 9g/m ²		散布			
チンゲンサイ	アブラムシ類 キスジノミハムシ	6g/m ²	定植時	土壌混和		3回以内 (は種時及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布は2回以 内)	
非結球あぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイを 除く)	アブラムシ類 キスジノミハムシ		は種時	播溝土壌混和		3回以内 (は種時の土壌混和 は1回以内、散布は 2回以内)	
かぶ	アブラムシ類						
ほうれんそう	アブラムシ類	は種時	3回以内(は種時の 土壌混和は1回以内、 散布、空中散布、 無人航空機散布は合 計2回以内)				
だいず	フタスジヒメハムシ	9g/m ²	定植時	播溝土壌混和		3回以内 (は種時及び定植時 の土壌混和は合計1回 以内、散布は2回以 内)	
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9g/m ²	定植時	植溝土壌混和		1回	
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株	定植時	植穴土壌混和		1回	
オクラ	アブラムシ類	9g/m ²	生育期 但し、収穫開始 14日前まで	株元散布	3回以内 (株元散布は1回以 内、散布は2回以 内)		
さやえんどう	ハモグリバエ類						
きく ガーベラ	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)	定植時	5回以内	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以 内)	
	マメハモグリバエ	2g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)					
花き類・ 観葉植物 (きく、 ガーベラ を除く)	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株 (但し、1m ² 当り 30gまで)	定植時	1回	植穴土壌混和		
	アブラムシ類	20g/m ²	生育期	5回以内	株元散布		
つつじ類	ツツジゲンバイ		発生初期		5回以内		
えだまめ	フタスジヒメハムシ	6g/m ²	は種時	播溝土壌混和	3回以内(は種時の 土壌混和は1回以内、 散布、空中散布、無 人航空機散布は合計 2回以内)		
レタス	アブラムシ類 ナモグリバエ	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内(は種前の 培土混和は1回以 内、育苗期の株元散 布、定植時の土壌混 和及び育苗トレイへ の灌注は合計1回以 内、散布は2回以 内)	
しそ	マデイラコナカイガラムシ	2g/株 (但し、1m ² 当り 25gまで)			3回以内(定植時の 土壌混和は1回以 内、散布は2回以 内)		

■については有効成分を含む農業の総使用回数を示すものです。