

登録番号 第 23330 号

サニーフィールド<sup>®</sup>MC

- 速効性に優れた殺虫剤です。  
 特長： ●溶媒臭がなく、扱いやすいマイクロカプセル化製剤です。  
 ●樹木類にも使用できる活用幅の広い殺虫剤です。

サニーフィールドは三井化学クロップ&amp;ライフソリューション(株)の登録商標です。

有効成分	エトフェンプロックス（化管法第1種）・・・20.0%	包装	500mL×20
その他化管法該当成分	－		
性状	白色水和性粘稠懸濁液体	有効年限	3年
毒性	普通物 <sup>※</sup>	危険物	－

※普通物：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

## 【適用病害及び使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	2000倍	0.3L/m <sup>2</sup>	発生初期	3回以内	散布	3回以内
	ケラ		1L/m <sup>2</sup>				
樹木類 (つつじ類を除く)	ケムシ類	2000～4000倍	100～700 L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
つつじ類	ケムシ類	2000～4000倍	100～700 L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	ツツジゲンバイ	1000倍					

## 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 使用前によく振ってから使用すること。
- 蚕に対して長期間強い毒性があるので、薬液の飛散により桑の茎葉を汚染することのないように桑園のある地帯では使用しないこと。
- 散布器具、作業衣などは桑用と必ず区別すること。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
  - ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
  - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

**人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法**-----

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。
- (2) 使用の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。使用後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする。
- (3) 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

**水産動植物に有毒な農薬については、その旨**-----

- (1) 水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。養殖池等周辺での使用は避けること。
- (2) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

**引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨**-----

通常の使用方法ではその該当がない。

**貯蔵上の注意事項**-----

直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。